

Gebrauchsinformation

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollten. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Zovirax® Lippenherpescreme

Wirkstoff: Aciclovir

Zusammensetzung

Arzneilich wirksamer Bestandteil:

1 g Creme enthält 50 mg Aciclovir.

Sonstige Bestandteile:

Propylenglycol, weißes Vaseline, Cetylstearylalkohol (Ph. Eur.), dickflüssiges Paraffin, Poloxamer 407, Natriumdodecylsulfat, Dimeticon 20 und gereinigtes Wasser.

Darreichungsform und Inhalt

Tube mit 2 g Creme

Stoff- oder Indikationsgruppe

Zovirax Lippenherpescreme ist ein Arzneimittel, welches das Wachstum bestimmter Viren hemmt (Virostatikum, Virus-DNS-Polymerasehemmstoff).

Pharmazeutischer Unternehmer

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co. KG
Bußmatten 1
77815 Bühl
Tel.: 07223 / 76-0
Fax: 07223 / 76-4000

Hersteller

Glaxo Wellcome Operations
Glaxo Wellcome House
Greenford
Middlesex UB6 0NN
Großbritannien

Anwendungsgebiete

Zur lindernden Behandlung von Schmerzen und Juckreiz bei rezidivierendem Herpes labialis (häufig wiederkehrende, durch Herpes-simplex-Viren verursachte Lippenbläschen).

Gegenanzeigen

Wann dürfen Sie Zovirax Lippenherpescreme nicht anwenden?

Überempfindlichkeit gegenüber Aciclovir oder Valaciclovir oder einen der oben genannten Hilfsstoffe. Zovirax Lippenherpescreme darf nicht auf Schleimhäute (z. B. in der Mundhöhle, am Auge oder in der Scheide) aufgetragen werden, da sonst mit lokalen Reizerscheinungen zu rechnen ist. Bei Vorliegen von Störungen der körpereigenen Immunabwehr oder schweren Verlaufsformen von Herpes labialis ist diesbezüglich vor Behandlungsbeginn ein Arzt zu konsultieren.

Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Nach Markteinführung wurden Daten zur Anwendung während der Schwangerschaft - über alle verfügbaren Darreichungsformen und Stärken von Zovirax - in einem sogenannten Schwangerschaftsregister dokumentiert. Diese zeigten keine erhöhte Missbildungsrate im Vergleich zur normalen Bevölkerung. Die aufgetretenen Missbildungen waren nicht einheitlich, so dass nicht auf Zovirax als Ursache geschlossen werden kann.

Die Anwendung während der Schwangerschaft sollte nach Abwägung des Nutzens und möglicher Risiken erfolgen.

Nach systemischer Anwendung geht Aciclovir in die Muttermilch über. Jedoch ist die Dosis, die ein Kind nach Anwendung von Zovirax Lippenherpescreme dann durch das Stillen aufnehmen würde, vernachlässigbar.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

Siehe „Gegenanzeigen“ und „Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung“.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Für Zovirax Lippenherpescreme sind keine Wechselwirkungen mit anderen Mitteln bekannt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Soweit nicht anders verordnet, wird die Creme 5 x täglich alle 4 Stunden tagüber dünn auf die infizierten und die angrenzenden Hautbereiche aufgetragen.

Wie sollten Sie Zovirax Lippenherpescreme anwenden?

Zovirax Lippenherpescreme sollte mittels eines Wattestäbchens aufgetragen werden, indem dieses mit einer für die Größe der infizierten Hautbereiche notwendigen Menge bestrichen wird. Beim Auftragen sollte darauf geachtet werden, dass nicht nur die bereits sichtbaren Anzeichen des Herpes (Bläschen, Schwellung, Rötung) mit der Creme bedeckt werden, sondern dass auch angrenzende Bereiche in die Behandlung mit einbezogen werden. Falls das Auftragen mit der Hand erfolgt, sollte diese vorher und nachher gründlich gewaschen werden, um eine zusätzliche Infektion der geschädigten Hautpartie, z. B. durch Bakterien bzw. eine Übertragung der Viren auf noch nicht infizierte Schleimhaut- und Hautbereiche, zu verhindern.

Wie lange sollten Sie Zovirax Lippenherpescreme anwenden?

Die Behandlungsdauer beträgt im Allgemeinen 5 Tage. Kommt es während der Behandlung zu einer Verschlechterung der Hauterscheinungen oder sind spätestens nach 10 Tagen Behandlungsdauer die Bläschen nicht verkrustet oder abgeheilt, so ist die Behandlung abzubrechen und ein Arzt aufzusuchen.

Nebenwirkungen

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Zovirax Lippenherpescreme auftreten?

Nach der Anwendung von Zovirax Lippenherpescreme kann vorübergehendes Brennen oder Stechen auf den behandelten Hautabschnitten auftreten. Rötung, Eintrocknung, Juckreiz und Abschuppung der mit Zovirax Lippenherpescreme behandelten Haut wurden gelegentlich beobachtet. Selten wurde nach Anwendung der Zovirax Lippenherpescreme vom Auftreten einer Kontaktdermatitis berichtet. Wurden allergologische Untersuchungen durchgeführt, erwiesen sich in den meisten Fällen die Hilfsstoffe der Creme-Grundlage und nicht der Wirkstoff Aciclovir als deren Ursache.

Eine Kontaktdermatitis ist daran zu erkennen, dass die obengenannten Nebenwirkungen verstärkt auftreten und über die mit der Creme behandelten Hautabschnitte hinausgehen.

In sehr seltenen Fällen kam es bei der äußerlichen Anwendung von Aciclovir zu plötzlich auftretenden Überempfindlichkeitsreaktionen einschließlich Angioödem (Quincke-Ödem, blasse Schwellung der Haut vor allem im Gesichtsbereich).

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels

Zovirax Lippenherpescreme soll nach Ablauf des auf der Packung angegebenen Verfallsdatums nicht mehr angewendet werden.

Wie ist Zovirax Lippenherpescreme aufzubewahren?

Nicht kühl aufbewahren.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Stand der Information: November 2002