



Aufgrund des Gehaltes an Butylhydroxytoluol können bei entsprechend veranlagten Patienten Überempfindlichkeitsreaktionen in Form von Reizungen an Haut, Augen und Schleimhäuten auftreten.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:

Das Verfallsdatum dieser Packung ist auf der Faltschachtel und auf dem Tubenfalz vermerkt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!

Stand der Information: Januar 2005

Apothekenpflichtig

Zul.-Nr. 7973.00.00

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Als forschendes Unternehmen sind wir sehr an Ihren persönlichen Erfahrungen mit Cor-Vel® Truw interessiert. Bitte schreiben Sie an unseren medizinischen Service unter dem Stichwort Cor-Vel® Truw an folgende Adresse:

TRUW Arzneimittel Vertriebs GmbH
Postfach 3150, D-33261 Gütersloh

truw
arzneimittel
...naturverbunden

02550105 RU

truw
arzneimittel



...naturverbunden


GEBRAUCHSINFORMATION

bitte sorgfältig lesen

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt/Heilpraktiker oder Apotheker.

Cor-Vel® Truw



Zusammensetzung:

1g Salbe enthält als
arzneilich wirksame Bestandteile:

Campher	38 mg	Menthol	17 mg
Fichtennadelöl	29 mg	Rosmarinöl	60 mg

sonstige Bestandteile:

Aluminiumhydroxid-distearat, (2-Ethylhexyl)-palmitat, Glycerol, Glycerol-Sorbitanfettsäureester, Magnesiumstearat, Magnesiumsulfat-Heptahydrat, Butylhydroxytoluol, L(+)-6-O-Palmitoylascorbinsäure, Citronensäure-Monohydrat, Glycerolmonostearat, Propylenglycol, dickflüssiges Paraffin, gereinigtes Wasser.

Darreichungsform und Inhalt:

Salbe, Originalpackungen mit 25 g (N1) und 50 g (N2) Salbe

Stoff- oder Indikationsgruppe:

Pflanzliches Herzmittel (Cardiacum)

Pharmazeutischer Unternehmer:

TRUW Arzneimittel Vertriebs GmbH
Postfach 3150, D-33261 Gütersloh
Telefon-Nr.: 05241/30074-0
Telefax-Nr.: 05241/30074-15

Hersteller:

RubiePharm Arzneimittel GmbH
Brüder-Grimm-Str. 121
D-36396 Steinau an der Straße





Anwendungsgebiete:

Segmenttherapie bei nervös bedingten Herzbeschwerden.

Hinweis:

Bei anhaltenden oder unklaren Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die eine ärztliche Abklärung und Behandlung erfordern.

Gegenanzeigen:

Wann dürfen Sie Cor-Vel® Truw nicht anwenden?

Cor-Vel® Truw soll nicht angewendet werden bei Bronchialasthma (Asthma bronchiale) und Keuchhusten.

Cor-Vel® Truw darf nicht auf geschädigte Haut, z.B. bei Verbrennungen, aufgetragen werden. Bei einer Überempfindlichkeit gegen ätherische Öle wie Fichtennadelöl, Rosmarinöl oder gegen Campher, Menthol oder Propylenglycol sollte Cor-Vel® Truw nicht angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:

Welche Vorsichtsmaßnahmen müssen beachtet werden?

Cor-Vel® Truw ist nur zur äußerlichen Anwendung bestimmt.

Cor-Vel® Truw sollte aufgrund des hohen Camphergehaltes und der ätherischen Öle nicht in die Nähe der Augen oder in die Augen, auf Schleimhäute oder auf offene Wunden gebracht werden.

Nach der Anwendung bitte die Hände gut waschen!

Was ist bei Kindern zu beachten?

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll daher bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit berücksichtigen?

Cor-Vel® Truw soll wegen nicht ausreichender Untersuchung in der Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Welche anderen Arzneimittel beeinflussen die Wirkung von Cor-Vel® Truw oder werden von Cor-Vel® Truw beeinflusst?

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind nicht bekannt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:

Die Dosierung und Dauer der Anwendung müssen an die individuelle Reaktionslage, das Indikationsgebiet und die Schwere der Krankheit angepasst werden. Hierbei gilt der Grundsatz, die Dosis so gering und die Behandlungsdauer so kurz wie möglich zu halten.

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Cor-Vel® Truw nicht anders verordnet wurde. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Cor-Vel® Truw sonst nicht richtig wirken kann.

Wie viel von und wie oft sollten Sie Cor-Vel® Truw anwenden? Wie und wann sollten Sie Cor-Vel® Truw anwenden?

2 bis 3-mal täglich wird ein 1-2 cm langer Salbenstrang in die über dem Herzen liegenden Hautbezirke und – bei ausstrahlenden Schmerzen – eine entsprechende Salbenmenge in die Unterseite des linken Oberarms einmassiert.

Wie lange sollten Sie Cor-Vel® Truw anwenden?

Wie bei allen Reiztherapien kann es nach mehrwöchiger Anwendung zu einer Gewöhnung kommen. Es wird deshalb empfohlen, in diesem Fall nach ca. 6 Wochen einen behandlungsfreien Zeitraum von 1-2 Wochen einzulegen.

Nebenwirkungen:

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Cor-Vel® Truw auftreten? Welche Gegenmaßnahmen sind bei Nebenwirkungen zu ergreifen?

Bei empfindlichen Personen sind verstärkte Reizerscheinungen oder Kontaktekzeme möglich. Das Arzneimittel ist sofort abzusetzen und die betroffenen Hautpartien sind mit warmem Wasser abzuspülen.

Krämpfe der Bronchialmuskeln (Bronchospasmen) können verstärkt werden (s.a. Gegenanzeigen).

